

<b>CENTRE HOSPITALIER</b> <i>Princesse Grace</i>	<b>INFORMATION PRE DON</b>	Codification : ENR/CTS/COL/005/2
Centre de transfusion sanguine	08/06/2011	Page 1 sur 2

### JUN 2011 - INFORMATIONS CONCERNANT LE DON DE SANG

a lire attentivement et lors de chaque don de sang !

Si le don du sang est irremplaçable, il existe des raisons de ne pas le donner, au moins temporairement afin de **ne nuire ni à votre santé ni à celle du receveur des produits sanguins issus de votre don.**

**N'offrez jamais votre sang dans le but d'obtenir un dépistage !**

**Une infection virale récente peut ne pas être détectée par les examens faits lors de chaque don de sang**

**Aucune donnée d'identité, aucune information relative à votre santé, aucun résultat des examens pratiqués ne seront divulgués**

#### Dans les 4 derniers mois, avez vous eu une infection, des soins dentaires ?

##### Durée de la contre-indication (C. I.) au don

<b>Traitement antibiotique</b> (hors acné), syndrome grippal ( $T^{\circ} > 38^{\circ}C$ ), infection urinaire, angine, otite, sinusite, abcès dentaire, plaie cutanée, eczéma au point de ponction	<b>15 jours</b> après guérison complète, => cicatrisation d'une plaie
<b>Gastro-entérite</b> résolutive en 48 h (sinon...)	<b>7 jours</b> (sinon 2 à 6 mois)
<b>Soins dentaires:</b> caries simples (1 j), <b>détartrage</b> , traitement de racines, 1 extraction dentaire: <b>7 jours</b>	<b>de 1 à 7 jours</b>
<b>Implants dentaires</b> , extraction de plusieurs dents de sagesse	<b>pendant 4 mois</b>



#### Dans les 4 derniers mois, avez-vous été opéré(e) ? Eu une endoscopie, des points de suture, un tatouage ?

##### Durée de la contre-indication (C. I.) au don

<b>Tatouage, piercing, maquillage permanent</b> , (acupuncture, mésothérapie, sclérose de varices = pas de contre-indication si aiguilles à usage unique)	<b>4 mois</b>
Accident d'exposition au sang, acte d' <b>endoscopie</b> (sauf ORL), anesthésie locorégionale	<b>4 mois</b>
<b>Chirurgie:</b> délai variable selon le type de chirurgie	<b>4 mois minimum</b>



#### Dans votre vie privée, êtes-vous concerné(e) par l'un des points suivants ?

##### Durée de la contre-indication (C. I.) au don

<b>Hépatite B ou C, infection à VIH dans l'entourage familial (même lieu de vie)</b>	<b>Tant que persiste le risque</b>
<b>Tout changement de partenaire sexuel(le)</b> ou partenaire occasionnel(le) dans les 4 derniers mois	<b>4 mois</b>
Traitement pour une <b>infection sexuellement transmissible (IST)</b> : gonorrhée, trichomonas, herpès	<b>4 mois</b>
Pratiques sexuelles à risque: multipartenariat, IST récente, sérologies positives...	<b>tant que persiste le risque</b>
Homo et bisexualité masculine, relations sexuelles contre argent ou drogue	<b>C.I. permanente</b>
Utilisation par voie injectable de drogues ou substances dopantes (stéroïdes anabolisants)	<b>C.I. permanente</b>



#### Les voyages : signalez vos séjours et voyages hors d'Europe

##### Durée de la contre-indication (C.I.) au don

Vous ou votre mère êtes né(e) hors d'Europe ?	
<b>Séjour</b> - même ancien - dans une zone où existe un risque de <b>Paludisme</b> ou en <b>Amérique Centrale ou Amérique du Sud</b>	<b>signalez le au médecin</b>
<b>Voyage</b> dans une zone où existe un risque de <b>Paludisme</b> ou en Amérique Centrale ou Amérique du Sud (maladie de Chagas)	<b>4 mois après le retour</b>
Séjour en zone d'endémie d'Hépatite B (sujets non vaccinés) : Afrique tropicale, Asie, Chine	<b>Bilan pré-don</b>
Séjour ou voyage dans un pays où sévit une épidémie virale (Chikungunya, Dengue ...)	<b>≅ 1 mois après retour</b>
Séjour de plus de <b>1 an</b> (tous séjours cumulés) en <b>Grande Bretagne entre 1980 et 1996</b>	<b>C.I. Permanente</b>



#### Avez-vous été atteint(e) d'une des maladies suivantes ?

Antécédents de brucellose, ostéomyélite, fièvre Q, tuberculose, rhumatisme articulaire aigu	<b>2 ans après guérison</b>
Antécédents de Babébiose, Kala Azar	<b>C.I. Permanente</b>
Antécédents de Toxoplasmose	<b>6 mois après guérison</b>

<b>CENTRE HOSPITALIER</b> <i>Princesse Grace</i>	<b>INFORMATION PRE DON</b>	Codification : ENR/CTS/COL/005/1
Centre de transfusion sanguine		Page 2 sur 2

<b>Etes-vous ou avez vous été anémique (manque de fer, de globules rouges) ?</b>		
<b>Durée de la contre-indication au don</b>		
<b>Anémie en cours (Hb &lt; 12 ♀, 13 ♂)</b> , carence en fer, ulcère, saignements		<b>6 mois</b>
Accouchement (pas de don pendant la grossesse)		<b>6 mois</b>
<b>Avez-vous eu une intervention chirurgicale touchant le cerveau, les yeux ?</b>		
<b>Avez-vous eu une greffe, une transfusion ?</b>		
<b>Application du principe de précaution visant à donner aux malades transfusés le degré le plus élevé de sécurité, compte tenu des données actuelles de la science.</b>		
<b>Durée de la contre-indication(C.I.) au don</b>		
Traitement avant 1989 par hormone de croissance extractive Antécédent familial de <b>maladie de Creutzfeldt-Jacob</b> Antécédent neurochirurgical, <b>chirurgie ophtalmologique</b> (nerf optique, rétine, énucléation) Traitement par glucocorticébroside placentaire (avant 1999) <b>Transfusion, toute greffe</b> humaine ou animale (os, cornée, dure-mère..)		<b>C.I. Permanente</b>  
<b>Vous êtes suivi(e) régulièrement par un médecin ? Vous prenez des médicaments ?</b>		
<b>Vous avez été vacciné(e) récemment ?</b>		
<b>Durée de la contre-indication (C.I.) au don</b>		
Antécédents de <b>cancer</b> (sauf conisation et cancer in situ de la peau après chirurgie) Certains <b>traitements</b> : Roaccutane ® (1 mois), Tigason ® et Soriatane ® (2 ans), Propecia ® (7 j), Griséfuline® (3j) Certains <b>vaccins</b> : fièvre jaune, rubéole, oreillons, rougeole, polio buvable <b>Hépatite B</b> (primo-vaccination) Sérothérapie (délai pour notion d'incubation d'une infection) Désensibilisation		<b>C.I. Permanente</b>  <b>4 semaines</b> <b>4 semaines</b> <b>4 mois (VHA, VHB, rage)</b> <b>3 jours</b>
<b>Etez-vous suivi(e) régulièrement par un cardiologue ?</b>		
<b>Durée de la contre-indication (C.I.) au don</b>		
<b>Troubles du rythme</b> : fibrillations, tachycardie, maladie de Bouveret... Maladie valvulaire, anomalies ECG, douleurs thoraciques coronariennes Artériopathie		<b>C.I. Permanente</b> 
<b>Avez vous été ou êtes vous asthmatique ?</b>		
<b>Durée de la contre-indication (C.I.) au don</b>		
<b>Asthme</b> : persistance de plus 2 crises / mois malgré le traitement Insuffisance respiratoire chronique		<b>C.I. Permanente</b> 
<b>Avez-vous prévu de faire une activité particulière le jour du don ?</b>		
<b>Durée de la contre-indication (C.I.) au don</b>		
<b>Compétition sportive</b> Trajet en voiture > 100 kms Activités professionnelles: travail en hauteur, transport en commun Sports aériens, aquatiques ou escalade		<b>pas de don 10 jours avant</b> <b>repos de 6 h minimum avant</b> <b>pas le jour du don</b> <b>pas le jour du don</b>

Si vous êtes concerné(e) par un de ces motifs d'exclusion, si vous souhaitez des précisions complémentaires, questionnez le médecin qui va vous recevoir.

**Remplissez en toute sincérité le questionnaire.**

Lors de votre don, sont prélevés des échantillons de sang permettant les analyses biologiques de dépistage (hépatites B et C, HIV, HTLV, syphilis) dont les résultats vous seront transmis. Un résultat positif confirmé entraîne une contre-indication définitive au don de sang et la destruction de l'unité prélevée

Un échantillon de votre don sera conservé en vue de contrôles éventuels ultérieurs.

Il est vivement recommandé de ne **pas être à jeun** pour donner votre sang.

**Dons de sang total**

**de 18 à 70 ans révolus, 4 fois par an pour les femmes et 6 fois par an pour les hommes**  
avec un intervalle de 8 semaines entre chaque don